

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



TREBON
30 EC

1. Nombre del Producto:

2. Clasificación del Producto:

INSECTICIDA

3. Ingrediente Activo:

Etofenprox, 287.5 gr/ L

4. Grupo Químico:

Piretroide-éter

5. Usos:

Arroz, Rosa

6. Categoría Toxicológica:

III Ligeramente Peligroso

7. Formulación:

CONCENTRADO EMULSIFICABLE

8. Registro ICA:

2192

9. Empresa Titular:

Summit Agro Colombia S.A.S.

10. Presentaciones:

500cc, 1Lt, (envases plásticos)

11. Mecanismo de Acción:

Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, disturbando la función de las neuronas, mediante la interacción con los canales de sodio.

12. Modo de Acción:

TREBON 30 EC es un insecticida cuyo ingrediente activo Etofenprox, está compuesto únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene efecto prolongado. Controla rápidamente por contacto e ingestión un amplio espectro de insectos plagas. Pertenecer a la clase insecticida “piretroide-éter”, y actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, disturbando la función de las neuronas, mediante la interacción con los canales de sodio.

13. Apariencia: Líquido color ámbar. Olor aromático.

14. Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Y APLICACIÓN	Período de Carencia	Período de Reentrada
Arroz	Chinche del arroz (<i>Oebalus spp.</i>)	0.3 L/ha	21 días	12 horas
Uso en ornamentales*				
Rosa	Thrips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.5 cc/L	No aplica	12 horas
<p>*Se efectuaron pruebas de FITOTOXICIDAD en CLAVEL y CRISANTEMO, sin presentarse síntoma alguno. "Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada.</p>				

15. Frecuencia y época de aplicación:

Se recomienda aplicar TREBON® 30 EC dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción siguiendo las recomendaciones del Comité de Acción de Resistencia a Insecticidas (IRAC) y complementar con prácticas de manejo integrado de cultivo. Para lograr un control eficaz de las plagas indicadas, siga las siguientes recomendaciones:

Arroz: Realice una aplicación cuando el cultivo se encuentre en espigamiento de 5 hasta 100%, en estado lechoso con presencia de chinche en el umbral establecido por la finca.

Ornamentales: Realice una aplicación, cuando la población alcance el umbral de daño económico.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Se puede aplicar con los equipos convencionales. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Se deben utilizar las boquillas que aseguren buena cobertura (tamaño de gota y número de gotas/cm²) utilizadas para la aspersión de insecticidas. Se recomienda un volumen de

mezcla de 200L/Ha para arroz y 1.000L/Ha para ornamentales, sin embargo este se debe determinar a partir de la calibración en campo, buscando buena cobertura.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: TREBON® 30 EC es compatible con productos agroquímicos y cultivos en general. Incompatible con materiales alcalinos fuertes, ácidos fuertes, agentes oxidantes/reductores fuertes. Las mezclas de productos agroquímicos, fertilizantes o reguladores fisiológicos efectuadas con TREBON® 30 EC, deben ser probadas previamente en cantidades y áreas pequeñas para confirmar su compatibilidad. Dichas mezclas siempre deben usarse inmediatamente después de su preparación y no deben dejarse de un día para otro.

TREBON 30 EC no genera efectos nocivos sobre follaje y flores de las variedades de rosa: Cherry O, Deja vu, Cream cream, Freedom, Lovely lidia, Majolika, Pink gemini, Super nova, Verdy, White majolika, Yellow babe; clavel: Don pedro, Farida, Porto, Tangelo y Vortex; crisantemo: Cooper, Handsome y Harley, sin embargo, debido al alto número de especies y variedades de plantas ornamentales sembradas en el país, se recomienda realizar una prueba de fitocompatibilidad previo a su uso en especies y variedades diferentes a las antes mencionadas.

Categoría Toxicológica: III (Medianamente Toxico- Cuidado)

Lea la etiqueta antes de usar el producto. Plaguicida. Consulte con su Ingeniero Agrónomo. ®Marca Registrada de Mitsui Chemical Agro Ltd.

**Importado y Distribuido por SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.
Carrera 7 # 127 – 48, Oficina 808, Edificio Centro Empresarial 128
Tel. (57-1) 5140407.
Bogotá, D. C. Colombia.**